



1 КАПСУЛАНЫҢ ҚҰРАМЫ:

Д-манноза.....	200,0 мг
Мүкжидек жемісінің сығындысы.....	95,0 мг
Жүгері жібегінің сығындысы (аналық ауызы).....	95,0 мг
Толғақшөп сығындысы.....	45,0 мг
Сүйиментамыр сығындысы.....	45,0 мг
Гүлшетен жапырағының сығындысы.....	45,0 мг

ҚОСАЛҚЫ ЗАТТЕК:

Жүгері крахмалы, май қышқылдарының магний тұздары, желатин, темір оксиді қызыл, темір оксиді сары.

ТОЛҒАҚШӨП СЫҒЫНДЫСЫ тәбеттің ашылуына, асқазан-ішек жолдарының секреторлық белсенділігіне, ас қорытуды жақсартуға, асқазан-ішек жолдарының қозғалғыштығын арттыруға, жеделдетуге ықпал етеді. Ол несеп тастарының пайда болуының алдын алу үшін қолданылады.

СҮЙМЕНТАМЫРЫНЫҢ СЫҒЫНДЫСЫ жүрек және бүйрек тектес ісінулерге және несеп шығару жолдарының қабыну процестеріне қолданылады. Ол несеп айдағыш, өт айдағыш, жел айдағыш, тыныштандыратын әсерге ие, тәбетті ашады, асқазан-ішек жолдарының функционалдық белсенділігін ынталандырады, жүрек-қантaмыр жүйесінің қызметін реттейді.

ГҮЛШЕТЕН ЖАПЫРАҒЫНЫҢ СЫҒЫНДЫСЫ несеп айдағыш әсерге ие, жүрек-қантaмыр жүйесінің функционалдық белсенділігіне оң әсер етеді.

МҮКЖИДЕК ЖЕМІСІНІҢ СЫҒЫНДЫСЫ ауру тудырғыш бактериялардың қуыққа енуіне жол бермейді. Несеп шығару жүйесінің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Несеп шығаруды қалыпқа келтіруге, бүйрек пен несеп жолдарының функционалдық жағдайын жақсартуға ықпал етеді. Жүгері жібек сығындысы (аналық ауыз) өт айдайтын, өт айдайтын және спазмолитикалық әсерге ие.

Несеп жолдарынан ұсақ тастарды кетіруге көмектеседі.

Д-МАННОЗА ағзада іс жүзінде ыдырамайды: өзгеріссіз сіңгеннен кейін ол қуыққа енеді, онда ол бактериялардың жіптерімен (пили) байланысады және олардың қуық клеткаларына жабысуына жол бермейді. Нәтижесінде бактериялар ағзадан несеппен бірге шығарылады.

ҚОЛДАНУ АЯСЫ:

 Зәр шығаруды қалыпқа келтіруге, бүйрек пен зәр шығару жолдарының функционалды жағдайын жақсартуға көмектеседі.

 Бүйрек пен зәр шығару жолдарындағы қабыну процестерінің даму қаупін азайту үшін ұсынылады.

 Ол бүйрек пен зәр шығару жүйесінің бұзылуының, зәр шығару тастарының пайда болуының алдын алу үшін қолданылады.

 Диуретикалық әсердің жоғарылауына ықпал етеді.

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР:

14 жастан бастап балаларға тамақтану кезінде тәулігіне 1 капсула, Ересектерге тамақтану кезінде тәулігіне 1 рет 2 капсула ішіңіз. Аз мөлшерде су ішіңіз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТКІШТЕР:

Өнім компоненттеріне жеке төзбеушілік. Қолданар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.

ШЫҒАРЫЛУ ТҮРІ: 30 капсула.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ:

15-30 °C бөлме температурасында құрғақ жерде сақтау.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.